

Nyhetsblad 3 från MAS

***Från och med den 1 mars gäller nya rekommendationer för påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19.**

*Det innebär bland annat att personer som är 80 år eller äldre, eller bor på SÄBO, rekommenderas två påfyllnadsdoser per år. Personer som är 65-79 år, eller har medicinska riskfaktorer rekommenderas en dos per år.

*De som är 65-79 år, eller har medicinska riskfaktorer rekommenderas en dos per år, inför vintern i första hand.

*Även personer som är 50-64 år rekommenderas påfyllnadsdos inför vintern om det gått längre tid än 9 månader sedan senaste dosen.

*För personer yngre än 50 år finns inte längre några rekommendationer om vaccination mot covid-19. Den som önskar eller får en rekommendation av sin behandlande läkare att vaccinera sig har ändå möjlighet vaccinera sig.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort kravet för smittspårning av covid-19 och regionen följer detta. Beslutet gäller från och med 15 mars.

Detta kommer att medföra följande:

- Vid positiv prov på Covid-19 ska ingen smittspårning ske oavsett vård eller boendeform.
- Exponerade patienter/vårdtagare provtas inte vid symtomfrihet. Exponerade patienter på dag 5 provtas inte.
- Hos patienter/brukare med luftvägssymtom av oklar orsak utan positivt covid-19 test ska munskydd och visir användas.
- Vid konstaterat positivt covid-19 prov ska andningsskydd och visir användas 7 dagar från symtomdebut.
- Vid pågående utbrott av covid-19 inom slutenvård, korttidsboende, närvårdavdelningar och SÄBO för äldre ska man använda andningsskydd och visir vid nya fall med stark misstanke om covid-19 innan provsvar finns.
- Patienter/vårdtagare med luftvägssymtom inom slutenvård, korttidsvård, närvårdsavdelningar och SÄBO för äldre ska fortsatt provtas vid symtom. Detta för att isolering och antiviral behandling kan bli aktuell.
- Vid utbrott av covid-19 eller influensa inom ovanstående enheter kontakta vårdhygien på tel 018-6113902 eller vardhygien@akademiska.se.

Frågor och svar angående att smittspårning upphör för Covid-19

***När ska vi ta luftvägsprov?**

När patient har symtom och är inlagd på slutenvård, närvårdsenhet eller korttidsvård eller SÄBO för äldre eller för medicinsk indikation.

***Ska smittspårning utföras någon gång?**

Ja vid utbrott kan smittspårning bli aktuellt, efter kontakt med vårdhygien.,

***När ska andningsskydd/munskydd användas?**

Munskydd och visir används vid alla oklara luftvägssymtom vid vård av patient/vårdtagare.

Andningsskydd och visir används vid konstaterat positivt covid-19 prov de första sju dagarna från symtomdebut oavsett boendeform.

Vid utbrott inom slutenvård, närvårdsenhet eller korttidsvård eller SÄBO för äldre används andningsskydd vid stark misstanke om nya fall innan provsvar finns.

***Ska exponerade provtas?**

Nej detta har tagits bort. Dag 5 för exponerade har också tagits bort.

***Vad gäller på LSS, hemsjukvård, hemtjänst, daglig verksamhet och dagverksamhet?**

Ingen provtagning eller smittspårning.

Bedöms som allmänheten, endast provtagning på medicinska indikationer efter läkarkontakt.

Anette.frode@osthammar.se